

Allergiestest bij volwassenen

Patiënteninformatie KNO

Allergietest bij volwassenen

Het onderzoek

Met deze test wordt door middel van verschillende soorten vloeistof aangetoond of u allergisch bent. U krijgt druppeltjes op de arm met daarin een klein krasje. Deze kunnen gaan jeuken.

De reactie wordt na 15 minuten afgelezen.

Vorbereiding

Let op:

- **72 uur** voor het onderzoek mag u de volgende medicijnen/antihistaminica niet gebruiken: Aerius, Mizollen, Tavegil, Xyzal, Telfast, Prednison, Zyrtec, Kestine, Ketotifen, Triludan, Zaditen, Claritine, Allerfree, Phenergan, Tinset, Cetirizine, Desloratidine, Cyclizine, Marzine, Cinnarizine en Primatour.
- **24 uur** voor het onderzoek mag u lokaal geen crèmes of zalven smeren op de onderarmen.

Contact

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder, aarzel dan niet uw vragen te stellen aan uw KNO-arts.

De polikliniek KNO is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 - 70 67 342.