Allergiestest bij volwassenen

Patiënteninformatie KNO

Allergietest bij volwassenen

Het onderzoek

Met deze test onderzoeken we of u allergisch bent. We druppelen verschillende vloeistoffen op uw arm. Daarna maken we kleine krasjes in uw huid. Dit kan gaan jeuken.

Na 15 minuten bekijken we de reactie op uw huid. Zo zien we waar u mogelijk allergisch voor bent.

Voorbereiding

Let goed op:

- **Stop 72 uur** vóór het onderzoek met de volgende medicijnen (antihistaminica):
  Aerius, Mizollen, Tavegil, Xyzal, Telfast, Prednison, Zyrtec, Kestine, Ketotifen, Triludan, Zaditen, Claritine, Allerfree, Phenergan, Tinset, Cetirizine, Desloratidine, Cyclizine, Marzine, Cinnarizine en Primatour.
- **Smeer 24 uur** vóór het onderzoek geen crème of zalf op uw onderarmen.

Contact

Gebruikt u de BeterDichtbij app en is uw vraag niet dringend? Stel dan uw vraag via de BeterDichtbij app.
Heeft uw vraag spoed of heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor BeterDichtbij? Neem dan telefonisch contact op met de polikliniek KNO.
De polikliniek KNO is bereikbaar op: 088 - 70 67 342.
Kijk op de website voor de actuele bereikbaarheid van de polikliniek: KNO - Bravis | Bravis.

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder, aarzel dan niet deze te stellen aan uw KNO-arts.