

Ferinject (ijzerhoudend infuus)

Patiënteninformatie Dagopname

Ferinject

(IJzerhoudend infuus)

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen voor een behandeling tegen bloedarmoede als gevolg van ijzergebrek. Het lichaam heeft ijzer nodig voor het aanmaken van de rode kleurstof (hemoglobine) in de rode bloedcellen. De hemoglobine speelt een belangrijke rol bij het transport van zuurstof van de longen naar de lichaamscellen via het bloed. U krijgt een ijzerhoudend infuus omdat u geen ijzerhoudende tabletten of drank kunt verdragen of omdat uw lichaam deze niet goed op kan nemen. Ferinject is een vloeibaar ijzerhoudend concentraat. Ferinject wordt eerst verdund met een zoutoplossing (normale infuusvloeistof), waarna het toegediend wordt via een infuus in de hand of arm.

Vorbereiding

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.

Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent, tenzij uw behandelend arts anders met u heeft afgesproken.

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich in het Bravis ziekenhuis:

- locatie Bergen op Zoom afdeling Dagopname G3 op de 3e etage
- locatie Roosendaal afdeling Dagopname routenummer 145

Tijdens uw opname op de afdeling is begeleiding op de kamer niet mogelijk. Na aanmelding bij de balie krijgt uw begeleiding de vraag om de afdeling te verlaten totdat u weer naar huis mag.

Tijdens de behandeling in een bed of een behandelstoel. Een verpleegkundige geeft u een infuusnaald in de hand of arm. Het infuus loopt 15 minuten, daarna blijft u een half uur ter observatie.

Wordt u doorgestuurd door de cardioloog, dan loopt het infuus twee uur, daarna blijft u een half uur ter observatie. Hierna verwijdt de verpleegkundige het infuus en mag u naar huis.

Het kan een tot twee weken duren voordat u resultaat merkt van het ijzerinfuus.

Heeft u geen klachten tijdens het infuus dan mag u na ontslag weer zelf aan het verkeer deelnemen. Zijn er tijdens het infuus wel klachten ontstaan dan kan het zijn dat u niet zelf mag deelnemen aan het verkeer.

Let op: Een ijzerinfuus kan een blijvende bruine verkleuring van de huid geven als het medicijn buiten het bloedvat komt. Waarschuw daarom als u ziet dat er een zwelling ontstaat rond de insteekplaats van de infuusnaald.

Bijwerkingen

Een behandeling met Ferinject kan de volgende bijwerkingen geven:

- metaalsmaak in de mond;
- braken, misselijkheid;
- maag- en darmproblemen;
- gevoelsstoornis;
- lage bloeddruk;
- hartkloppingen;
- duizeligheid;
- rood gezicht;
- koorts en rillingen;
- ontsteking op de plaats van het infuus;
- allergische reactie;
- kans op blijvende bruine verkleuring van de huid;
- spierpijn;

- warm gevoel.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit aan uw behandelend arts. In de eerste drie maanden van de zwangerschap mag u geen Ferinject behandeling krijgen.

Heeft u veel last van de bijwerkingen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige.

08/25