

## Laserbehandeling tegen een verhoogde oogdruk

### Patiënteninformatie Oogheelkunde

#### Laserbehandeling tegen een verhoogde oogdruk

### Inleiding

U heeft in het Bravis ziekenhuis een afspraak voor een behandeling met een laser om een verhoogde oogdruk te behandelen. We noemen deze behandeling een **SLT** (Selectieve Laser Trabeculoplastiek). Een laser is een geconcentreerde lichtbundel waarmee we heel precies het oog kunnen behandelen. De oogarts of physician assistant (PA) doet de behandeling op de polikliniek oogheelkunde.

### Vorbereiding op de behandeling

U krijgt één ampul met oogdruppels mee. De oogdruppels maken uw pupil kleiner. **Een half uur voor de behandeling** druppelt u eenmalig het te behandelen oog/ogen met deze ampul.

### De behandeling

Bij open kamerhoek glaucoom kunnen we met een laser de afvoer van vocht uit het oog vergroten. Vlak voor de behandeling verdoven we uw oog met een druppel. Tijdens de behandeling zit u achter een microscoop met uw kin op een steun en uw voorhoofd tegen de band. U krijgt een vergrootglasje met speciale gel op uw oog.

De oogarts vraagt u om recht vooruit naar een vast punt te kijken. De laser maakt ongeveer 50 - 100 kleine schroeiplekjes vlakbij het afvoersysteem van het oog. Hierdoor gaan de kanaaltjes van de afvoer open en kan kamerwater het oog gemakkelijk verlaten. De laserbehandeling is pijnloos en duurt maar enkele minuten.

### Na de behandeling

Na afloop kunt u wat wazig zien. Dit valt over het algemeen mee. U kunt wel hoofdpijn krijgen door de pupilverkleinende druppels.

Houd er rekening mee dat u vanwege het wazige zien na de behandeling **niet** zelf auto kunt rijden.

### Controle

Een dag na de behandeling krijgt u een controle op de polikliniek.

Na ongeveer 6 weken kunnen we het resultaat van de laserbehandeling goed beoordelen. Hiervoor krijgt u een afspraak op de polikliniek. Het effect van de behandeling kan afnemen in de loop der jaren. Een tweede behandeling is dan mogelijk. Het effect van een tweede behandeling kan minder zijn dan bij de eerste behandeling.

### Complicaties

Het oog kan ontstoken raken. Ook kan de oogdruk kortdurend stijgen. Het kan zijn dat de oogarts u hiervoor medicatie geeft of nog een aanvullende controle afspreekt.

Als u klachten krijgt, neem dan direct contact met ons op.

- Polikliniek oogheelkunde 088 – 70 68 980

Voor spoed buiten onze werktijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp.

- Spoedeisende hulp locatie Bergen op Zoom 088 – 70 67 302
- Spoedeisende hulp locatie Roosendaal 088 – 70 68 889

### Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde.