

Neotigason

Patiënteninformatie Dermatologie

Neotigason

Inleiding

Neotigason is een medicijn dat in hoge doseringen helpt bij sommige huidziekten. Het kan ook bijwerkingen geven. In deze folder leest u daarover meer.

Bijwerkingen

Tijdens de behandeling kunt u bijwerkingen krijgen. Soms merkt u die al vóórdat uw huid beter wordt. Laat u hierdoor niet ontmoedigen! De meeste bijwerkingen hebben te maken met de dosis. Bij een hogere dosis krijgt u meer bijwerkingen. Als de dosis wordt verlaagd verdwijnen de klachten meestal snel. Het is bijna nooit nodig om te stoppen met het medicijn vanwege de bijwerkingen.

Veel voorkomende bijwerkingen

- Droge lippen.

Dit komt heel vaak voor. Gebruik meerdere keren vette lippenzalf of lippenstift.

- Droge huid en droge slijmvliezen.

De huid kan gaan schilferen of vervellen. Vooral de huid van handpalmen en voetzolen. Een vette crème of zalf helpt. De slijmvliezen van de neus kunnen droog worden. Korstjes in de neus kunnen kleine neusbloedingen veroorzaken. Smeer dan regelmatig een dunne laag crème in uw neus.

- Irritatie van de ogen.

Door minder traanvocht kunnen uw ogen droog en geïrriteerd zijn. Vooral mensen met contactlenzen kunnen hier last van hebben. Oogdruppels helpen meestal.

- Wondjes aan de huid.

De bovenste huidlaag (hoornlaag) wordt tijdelijk dunner door gebruik van Neotigason. Daardoor ontstaan sneller kleine wondjes. Gebruik zo nodig papieren pleisters. Deze plakken niet zo sterk aan de huid en zijn makkelijker te verwijderen.

- Zongevervoeligheid.

U verbrandt sneller door de Neotigason. Vermijd felle zon en gebruik een goede zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van minstens spf 30/50.

- Haaruitval.

Na vier tot acht weken kan uw haar meer uitvallen. Dit kan hinderlijk zijn, maar is tijdelijk. Na het stoppen van het medicijn groeit het haar weer aan. Niet iedereen heeft last van deze bijwerking!

Minder vaak voorkomende bijwerkingen

- Neotigason kan het vet (cholesterol) in uw bloed verhogen. Daarom heeft u regelmatig bloedcontrole nodig om dit te controleren. Soms helpt een vetarm dieet of extra medicatie. Het is bijna nooit nodig om de behandeling met Neotigason om deze reden te stoppen.
- Na jarenlang gebruik van Neotigason kunnen problemen met de botten ontstaan. Daarom worden soms röntgenfoto's gemaakt. Meld het aan uw arts als u pijn heeft in botten of gewrichten. Bij kinderen kan Neotigason de lengtegroei remmen. De arts controleert dit daarom extra goed.
- Zelden raken de leverfuncties gestoord door gebruik van Neotigason. Regelmatig bloedonderzoek spoort dit vroeg op. Wordt u moe en/of krijgt u een gele huid of gele ogen (geelzucht)? Bel dan direct uw arts.

Belangrijk voor vrouwen

- Neotigason kan ernstige misvormingen aan de ongeboren baby veroorzaken. Vrouwen mogen het daarom in principe niet gebruiken in de vruchtbare leeftijd. In goed overleg met de arts kan van deze regel worden afgeweken. In dat geval moet u de volgende voorzorgen nemen:
 - U mag niet zwanger worden tijdens de behandeling én 2 jaar na het stoppen. In deze periode moet u zorgen voor een betrouwbare anticonceptiemethode.
 - Gebruikt u "de anticonceptiepil"? Begin hier minimaal een maand vóór de behandeling mee. Anticonceptiepillen met een lage dosering progesteron zijn niet geschikt in combinatie met Neotigason.
 - De arts kan u vragen vóór de behandeling een zwangerschapstest te (laten) doen om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent.

- Wordt u toch zwanger? Neem dan meteen contact op met uw arts. Dat geldt ook tot twee jaar na het stoppen met Neotigason.
- Moedermelk neemt Neotigason op. U mag daarom tijdens gebruik van Neotigason géén borstvoeding geven.
- Neotigason beïnvloedt de vruchtbaarheid bij vrouwen niet.

Belangrijk voor mannen

- Neotigason beschadigt de zaadcellen niet. De kans op aangeboren afwijkingen bij een kind is dus niet verhoogd.
- De behandeling met Neotigason beïnvloedt de vruchtbaarheid bij mannen niet.

Belangrijk voor bloeddonors

U mag geen bloed geven tijdens de behandeling met Neotigason. U mag pas weer bloed geven een jaar nadat u met de behandeling bent gestopt

Neotigason in combinatie met andere medicijnen

Vertel uw arts altijd precies wat voor andere medicijnen u gebruikt. Meestal kunnen deze medicijnen zonder problemen met Neotigason gecombineerd worden. Gebruik geen vitaminepreparaten met meer dan 4000-5000 internationale eenheden (LE.) vitamine A. Gelijktijdig gebruik van methotrexaat of een antibioticum uit de tetracyclinegroep (tetracycline, doxycycline, minocycline) is ook niet toegestaan.

Neotigason in combinatie met alcohol

Beperkt gebruik van alcohol kan geen kwaad. De lever breekt alcohol af. Lever en nieren breken samen Neotigason af. Overmatig drankgebruik kan de lever overbelasten.

Invloed op de rijvaardigheid

U wordt niet suf van Neotigason. Wel kan het gezichtsvermogen 's nachts wat verminderen. Daar kunt u ook last van hebben als u in tunnels rijdt.

Gebruiksaanwijzing en dosering

Neem de Neotigason-capsules in tijdens de maaltijd. De opname van Neotigason via de darmwand in het bloed verloopt beter samen met wat vette voeding. Een normale maaltijd voldoet aan deze voorwaarde.

De dagelijkse dosering is afhankelijk van de huidziekte en verschilt per persoon, De arts past de dosis regelmatig aan. Dit is afhankelijk van de toestand van de huid en het optreden van bijwerkingen.

Bewaar de capsules, net zoals andere geneesmiddelen, op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Bewaar ze in de oorspronkelijke verpakking. De werking van de capsules vermindert als ze aan licht worden blootgesteld.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

Het resultaat van de behandeling hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en de ernst van de huidziekte, de dosering en het al dan niet optreden van bijwerkingen. De gevoeligheid verschilt per persoon. Meestal treedt de eerste verbetering pas op in de tweede of derde week. Het 'maximale' resultaat merkt u pas na twee tot drie maanden. Bij psoriasis werkt Neotigason bij ongeveer 70% van de patiënten goed. Bij vormen van psoriasis waarbij pustels gevormd worden, werkt het middel nog beter. Het beste resultaat ontstaat als Neotigason gecombineerd wordt met lokale behandelingen en/of lichttherapie UVB). Daardoor kan de dosis Neotigason zo laag mogelijk zijn en treden er minder bijwerkingen op.

Conclusie

Neotigason is een zogenaamde 'systemische' behandeling. Dit wil zeggen dat u het middel via de mond inneemt. Het is zeer effectief. Het is wel een 'zwaarder' middel dan een zalf of een crème. Neotigason is dan ook vooral bedoeld voor patiënten met ernstige huidafwijkingen. In verband met (mogelijke) bijwerkingen is regelmatige en nauwkeurige controle door een (huid)arts erg belangrijk.

Vragen

Contact polikliniek dermatologie:

- De polikliniek dermatologie is te bereiken op telefoonnummer 088 - 70 67 343. Kijk voor hun actuele bereikbaarheid op: [Dermatologie-Bravis | Bravis](#)
- Heeft uw vraag geen spoed? Neem dan contact op via de Beter Dichtbij App

Contact DermaTeam:

- DermaTeam is tijdens werkdagen bereikbaar van 8.00 u - 13.00 u op telefoonnummer: 0118 - 67 30 50.
- Bij spoed kunt u tussen 13.00 en 17.00 bellen naar 0118-673051.
- Bij dringende problemen buiten kantooruren kunt u het algemene nummer van Bravis bellen via telefoonnummer: 088 - 70 68 000. U wordt dan doorverbonden met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat ook graag van u.

05/26