

## Niet ingedaalde zaadbal, Orchidopexie

### Patiënteninformatie Urologie

#### Niet ingedaalde zaadbal

#### Orchidopexie

### Inleiding

In overleg met u heeft de uroloog besloten een operatie bij uw zoon te verrichten. Bij de inschrijving van uw zoon bij het opnameplein krijgt u meer informatie over de dagopname.

### De zaadballen

De zaadballen ontwikkelen zich tijdens de zwangerschap in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de zaadballen via de lies in de balzak ingedaald. Normaal zitten bij de geboorte beide zaadballen in de balzak. Soms dalen de zaadballen niet in. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buik of lies zitten. De bal moet rond de eerste verjaardag op zijn plaats zitten. Op latere leeftijd kunnen er problemen met de vruchtbaarheid ontstaan. Een niet ingedaalde zaadbal beïnvloedt de seksuele functies niet. Soms probeert de uroloog met een strijkende handbeweging de bal naar beneden, in de balzak te brengen. Zijn de zaadballen aan het eind van het eerste levensjaar nog niet ingedaald? Dan is een operatie wenselijk.

### Pendelbal

Soms lijkt het of een zaadbal niet is ingedaald. Hij kan gemakkelijk in de balzak worden geduwd. Dit heet een pendelbal. Dat wil zeggen dat hij gemakkelijk heen en weer bewogen kan worden. Zo'n pendelbal komt rond de puberteit meestal vanzelf op zijn plaats.

### Vorbereiding

Hoe u uw zoon moet voorbereiden op de operatie leest u in de folders:

- [Kinderdagopname](#)
- [Nuchterbeleid kinderen tot 16 jaar](#)

### Operatie

De uroloog maakt een snee in de lies en een snee in de balzak. Via de snee in de lies zoekt hij de zaadbal op, brengt die naar de balzak en zet hem daar vast. Stelt de uroloog tijdens de operatie een liesbreuk vast? Dan verhelpt hij die meteen. De uroloog sluit de wonden meestal met oplosbare hechtingen. Die hoeven dus niet te worden verwijderd. De operatie duurt ongeveer een uur.

### Na de operatie

Ongeveer vier uur nadat uw zoon terug is op de afdeling mag hij mee naar huis. Thuis mag uw zoon wat water en thee drinken. Is uw zoon niet misselijk? Dan mag hij 's avonds wat licht voedsel zoals pap, bouillon, appelmoes of puree gebruiken. Geef hem geen koolzuurhoudende dranken. Zeker de eerste dag moet uw zoon rustig aandoen, dus in bed blijven of op de bank gaan liggen.

De dag na de operatie kunt u uw zoon weer gewoon zijn gang laten gaan. Waarschijnlijk is hij de eerste dagen minder actief. De pleister kunt u het best de eerste twee dagen laten zitten. Daarna mag u deze verwijderen. Uw zoon mag dan weer onder de douche of even in bad. Houd de wondjes schoon en droog. Dep de wondjes na het douchen of wassen droog.

Eventuele luiers kunt u het beste wat vaker verwisselen. Heeft uw zoon pijn? Dan mag u hem een paracetamol zetpil of tablet geven.

### Complicaties

- Complicaties beperken zich bijna altijd tot de wondjes.
- Er kan een nabloeding optreden die zich meestal uit in een bloeditstorting onder de hechting. Deze verdwijnt vanzelf. Behandeling is niet nodig.
- Een infectie of een abces komen zelden voor.
- Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-rood-achtig uitziet.

Krijgt uw zoon de eerste veertien dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

### Controle

U krijgt een afspraak op de polikliniek urologie om met uw zoon voor controle bij de uroloog te komen.

### Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, assistente of verpleegkundig consulent urologie.

## Contact

Gebruikt u de BeterDichtbij app en is uw vraag niet dringend? Stel dan uw vraag via de BeterDichtbij app.

De polikliniek urologie is telefonisch bereikbaar op: 088 – 70 68 272.

Kijk op de website voor de actuele bereikbaarheid van de polikliniek. [Urologie | Bravis](#)

Buiten kantooruren kunt u tot één week na uw ontslag de spoedeisende hulp bellen.

Bravis locatie Roosendaal: 088 – 70 68 889.

Bravis locatie Bergen op Zoom: 088 – 70 67 302.

04/26