

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)


Patiënteninformatie Chirurgie

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over het carpaal tunnel syndroom (CTS) en hoe dat behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is het carpaal tunnel syndroom?



Het carpale tunnel syndroom ontstaat door een bekneling van de zenuw in de onderarm (nervus medianus) ter hoogte van de pols (carpale tunnel). In deze nauwe tunnel lopen de buigpezen van de vingers en de zenuw. Bij een carpale tunnel syndroom is de carpale tunnel te nauw voor de inhoud waardoor de zenuw beknelde raakt.

Klachten bij carpaal tunnel syndroom

De klachten bij carpale tunnel syndroom zijn:

- dof, tintelend of pijnlijk gevoel in de hand en de duim, wijs- en middelvinger en een deel van de ringvinger;
- verdoofd gevoel van de vingertoppen waardoor u minder kracht in de vingers hebt en daardoor gemakkelijk dingen laat vallen;
- pijn straalt uit via de onderarm en elleboog tot in de schouder. 's Nachts nemen de klachten vaker toe waardoor u er wakker van kan worden.

Wat is de behandeling?

Een operatie is niet altijd noodzakelijk.

Niet operatieve behandelingen:

- veranderen van uw werkzaamheden;
- dragen van een nachtsplak;
- ontstekingsremmende medicijnen of een injectie met ontsteking remmende vloeistof in de carpale tunnel.

Operatie

Als de klachten ernstig zijn of niet verbeteren, kan een operatie nodig zijn om de ruimte binnen de carpale tunnel te vergroten. De operatie gebeurt op de poliklinische behandelkamer onder lokale verdoving of op de operatiekamer onder algehele narcose of een regionale verdoving van de arm.

Let op : Gebruikt u bloedverdunders? Meld dit dan vooraf aan de chirurg!

Via een handlijn maakt de chirurg een snee naar de pols toe. Daarna snijdt hij de dwarse polsband door om de tunnel wijder te maken. De zenuw blijft intact. Hierdoor raakt de hand niet stijf of verlamd. De chirurg hecht de wond en legt een drukverband aan. De operatie duurt ongeveer vijftien minuten

Na de operatie

U mag dezelfde dag naar huis. Houdt u er rekening mee dat u niet zelf mag autorijden of fietsen. U krijgt een controleafspraak op de polikliniek. De hechtingen worden dan verwijderd.


Weer thuis

De pijn na de operatie neemt in het algemeen na een dag snel af. Zonodig neemt u bij pijn paracetamol. Deze zijn verkrijgbaar bij apotheek of drogist. Wij adviseren u deze voor de operatie al in huis te hebben.

Adviezen

Om uw hand zo snel mogelijk weer goed te kunnen gebruiken, adviseren wij u het volgende:

- Leg uw hand hoger dan de elleboog (kussen eronder) om zwelling te voorkomen.
- Start meteen na de operatie met het oefenen van de hand en vingers.



- Verwijder het drukverband 48 uur na de operatie en plak een kleine pleister.
- Daarna mag u douchen. Dep de wond droog en doe er een droge pleister op.
- Til de eerste 3 weken niet te zwaar.
- Bij toename van zwelling moet u uw hand meer rust geven en goed hoog houden.

Tot 3 maanden na de operatie kunt u volgende klachten houden:

- verlies van kracht of handigheid;
- littekenpijn;
- gevoeligheid van de duim- en/of pinkmuis (=verlengde van duim/pink in handpalm);
- tintelingen.

Tot 6 maanden na de operatie kunt u last hebben van vermindering van gevoel in een of meerdere vingers.

Waren een of meerdere vingers al langere tijd voor de operatie gevoelloos? Dan bestaat de kans dat de vermindering van gevoel blijvend is.

Complicaties

Er bestaat een kleine kans op een wondinfectie of nabloeding.

Kenmerken van wondinfectie zijn:

- roodheid;
- toename pijn;
- koorts;
- zwelling.

Het specifieke risico van deze operatie is letsel van de zenuwtakjes, waardoor het gevoel van de vingers tijdelijk of definitief verminderd kan raken.

Wat te doen bij complicaties

Krijgt u binnen 60 dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis.

Contact

De polikliniek chirurgie is te bereiken op 088 - 70 67 368.

Kijk op de website voor de actuele bereikbaarheid van de polikliniek: [Chirurgie - Bravis](#) | [Bravis](#)

Gebruikt u de BeterDichtbij app en is uw vraag niet dringend? Stel uw vraag dan aan polikliniek chirurgie via de BeterDichtbij app.

Buiten kantooruren kunt u tot 1 week na uw ontslag bellen met de spoedeisende hulp:

088 - 70 68 889 Bravis locatie Roosendaal

088 - 70 67 302 Bravis locatie Bergen op Zoom

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of physician assistant.

05/26