

Poliklinische coagulatie blaastumor (Met stroom wegschroeien van een oppervlakkige blaastumor)

Patienteninformatie Urologie

Poliklinische coagulatie blaastumor (Met stroom wegschroeien van een oppervlakkige blaastumor)

Inleiding

U heeft een afwijking aan het blaasslijmvlies die behandeld hoort te worden. Bij deze behandeling via de plasbuis zal de uroloog kleine oppervlakkige blaastumoren wegbranden met behulp van een camera (cystoscoop) en stroomsonde. Vooral nieuwe oppervlakkige afwijkingen na eerder behandelde blaaskanker zijn geschikt voor deze behandeling. Er vindt in de meeste gevallen geen weefselonderzoek plaats. Een groot voordeel is dat het poliklinisch kan met plaatselijke verdoving.

Vorbereiding

Voor de behandeling is thuis geen speciale voorbereiding nodig.

Medicijnen

Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Geef dit vooraf door aan uw uroloog. In overleg met de uroloog moet u soms het gebruik van deze medicijnen een lange tijd voor de operatie stoppen.

De behandeling

U meldt zich een half uur voor de behandeling. Er wordt verdovingsvloeistof in de blaas gebracht door middel van een eenmalige katheter. De verdoving blijft in de blaas tot de behandeling. De verdoving wordt door een eenmalige katheterisatie uit de blaas gehaald. Dit gebeurt kort voor de behandeling. Daarna wordt de blaas gevuld met een spoelvloeistof. Met de cystoscoop wordt de afwijking opgezocht en weggebrand.

Na de behandeling

U kunt direct naar het toilet waar u de spoelvloeistof uit plast. Het is belangrijk goed te drinken om de blaas voldoende te spoelen.

Enkele adviezen

Drink anderhalf tot twee liter water per dag om eventueel bloed in de urine te verdunnen.

Voorkom te veel persen bij ontlasting. Mogelijk kan de ontlasting met medicijnen zachter worden gemaakt.

Controle afspraak

U krijgt een afspraak voor controle bij uw uroloog voor het volgende kijkonderzoek. De datum zal met u besproken worden.

Klachten na de behandeling

Kort na de behandeling kan het gevoelig zijn tijdens of na het plassen door het wondje in de blaas. Ook kan er wat meer aandrang zijn dan normaal. Er kan ook bloed of vlokjes in de urine zichtbaar zijn. Meestal verdwijnen deze klachten binnen enkele dagen.

Neem contact op met het ziekenhuis als binnen veertien dagen na de behandeling:

- U grote bloedstolsels plast en daardoor niet goed kan plassen.
- Het bloedverlies via uw urine niet minder wordt.
- U koorts boven de 38,5°C krijgt.
- Uw irritatie klachten van de blaas toenemen, bijvoorbeeld ernstige brandende pijn tijdens het plassen. (mogelijk een bacteriële blaasontsteking)
- U niet meer kunt plassen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, assistente of verpleegkundig consulent urologie.

Contact

Gebruikt u de BeterDichtbij app en is uw vraag niet dringend? Stel dan uw vraag via de BeterDichtbij app.

Kijk op de website voor de actuele bereikbaarheid van de polikliniek. [Urologie | Bravis](#)

Buiten kantooruren kunt u tot één week na uw ontslag de spoedeisende hulp bellen.

Bravis locatie Roosendaal: 088 – 70 68 889.

Bravis locatie Bergen op Zoom: 088 – 70 67 302.

08/25