Leefregels en bijwerkingen na methotrexaat toediening

Patiënteninformatie gynaecologie

Leefregels en bijwerkingen na methotrexaat toediening

Leefregels:

- mondhygiëne: 3x daags tanden poetsen met zachte borstel
- minstens 1,5 liter per dag drinken
- geslachtsgemeenschap wordt afgeraden
- blootstelling aan zon wordt afgeraden
- Vermijd alcohol en NSAID's (bepaalde groep pijnstillers zoals naproxen, diclofenac en ibuprofen) en antibiotica

De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn:

- misselijkheid
- braken
- buikpijn
- metaalsmaak
- ontsteking of blaasjes in de mond
- diarree
- haarverlies (gering)

In de studies worden geen ernstige complicaties beschreven.

Resten cytostatica kunnen tot dag 8 in het lichaamsvocht (urine, ontlasting, braaksel) aanwezig zijn.

- Na toiletgebruik twee maal doorspoelen met gesloten deksel en nadien handen wassen.
- Persoonlijke handdoeken gebruiken na douche/bad.

Advies na methotrexaat behandeling

Na een methotrexaat behandeling voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, minimaal 3 maanden te wachten om opnieuw zwanger te worden

Vragen

Bij vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek gynaecologie. Telefoonnummer: 088 - 70 66 600.

Heeft u een uitnodiging voor BeterDichtbij en heeft uw vraag geen spoed? Stel dan uw vraag via de BeterDichtbij app. U ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Heeft uw vraag spoed of heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor BeterDichtbij? Neem contact op met de polikliniek gynaecologie via telefoonnummer 088 – 70 66 600. Kijk op Gynaecologie - Bravis | Bravis voor de actuele bereikbaarheid.

03/25