

Teriparatide

Teriparatide thuistoediening

Patiënteninformatie interne geneeskunde

Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over de behandeling van het medicijn Teriparatide. In deze folder krijgt u informatie over de werking, het gebruik van het medicijn en wat u moet doen in geval van bijwerkingen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts.

Let op deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.

Waarom Teriparatide?

Bij u is botontkalking geconstateerd. Hierdoor heeft u een grotere kans op botbreuken. Het medicijn Teriparatide stimuleert de botaanmaak. De botten worden weer sterker. Er is dan een kleinere kans op botbreuken en inzakken van de ruggenwervels.

Hoe gebruikt u Teriparatide?

Dit medicijn moet u 1x per dag toedienen door een prik/injectie in de huid, in de buik of het bovenbeen. Prikinstructies krijgt u mee bij de poliklinische apotheek.

Thuiszorg

Het kan zijn dat u zichzelf nog nooit heeft geprikt of lastig vindt om dit bij u zelf te doen. Indien nodig kan de thuiszorg ingeschakeld worden. Zij komen bij u thuis om het prikken aan te leren. Na het aanmelden neemt de thuiszorg contact met u op om bezoeksafspraken te maken. Als het zelf prikken goed gaat zal de thuiszorg stoppen.

Wat moet u doen?

- De medicijnen bewaren in de koelkast.
- Bloed laten prikken, 6 weken na het starten van Teriparatide.
U krijgt hiervoor een aanvraagformulier mee van uw arts. Bloedprikken kan bij Diagnovum en gaat op sommige locaties op afspraak. Check hiervoor [Locaties Diagnovum voor bloedafname - bloedafname bij u in de buurt - Diagnovum](#)

U krijgt een telefonisch consult ingepland bij de arts, 9 weken na de startdatum.

Bijwerkingen Teriparatide

U kunt last krijgen van klachten op de prikplek, zoals roodheid, pijn, zwelling en jeuk. Dit is normaal. Eventuele andere bijwerkingen leest u terug in de bijsluiter.

Heeft u vragen of bent u ongerust? Neem dan contact op met uw apotheek.