

## Directe wenkbrauwlift

### Patiënteninformatie plastische chirurgie

#### Directe wenkbrauwlift

### Inleiding

Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenoogleden over de ogen heen gaat hangen. Dit kan problemen geven bij het zien. Patiënten vinden dat ze er moe of oud uitzien. Het kan ook hoofdpijnlachten geven. De oorzaak kan afzakken van de wenkbrauwen zijn (ptosis). Dit ontstaat door verslapping van de huid van het voorhoofd. We kunnen dit corrigeren met behulp van plastische chirurgie. Soms combineren wij een directe wenkbrauwlift met een correctie van de bovenoogleden.

### Wat u moet weten voor de operatie

#### Vergoeding

De verzekeraar vergoedt alleen de kosten voor een directe wenkbrauwlift als er sprake is van een medische indicatie. Als er geen medische indicatie voor de operatie is, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

#### Ontevreden over resultaat

Er is geen garantie op een (blijvend) goed resultaat. Het kan zijn dat de resultaten tegenvallen. Soms is een extra operatie nodig. Dit kan gepaard gaan met extra kosten voor u.

#### Psychische stoornissen

Het is belangrijk dat u weet dat de operatie gericht is op verbetering en niet op perfectie. Complicaties of minder fraaie resultaten zijn soms onvermijdelijk. Soms is een extra operatie nodig en dat wordt vaak als stressvol ervaren. Wij vragen u voor de operatie eventuele emotionele en psychische stoornissen met uw arts te bespreken.

#### Medicijnen

Het is belangrijk om uw arts te informeren over het gebruik van medicijnen, in het bijzonder van bloedverduuners.

#### Roken en meerroken

Mensen die roken of meerroken hebben meer kans op complicaties en een slechtere wondgenezing. Het is belangrijk niet te roken in de periode van 6 weken voor de operatie tot 6 weken na de operatie.

### Voor de operatie

- Correctie van de afgezakte wenkbrauwen doen we meestal onder plaatselijke verdoving. Het kan ook onder algehele verdoving.
- Krijgt u plaatselijke verdoving? Dan hoeft u niet nuchter te zijn.
- Krijgt u narcose? U moet nuchter zijn, lees de instructies in de folder [nuchterbeleid voor volwassenen](#). U wordt opgenomen in dagbehandeling.
- **Als u contactlenzen draagt, moet u deze vooraf uitdoen.**
- **Gebruik de dag van de operatie geen gezichtscrème en/of make-up.**
- U krijgt van de secretaresse te horen waar en hoe laat u zich moet melden voor de operatie.
- Na de operatie mag u niet zelf autorijden. Zorg voor vervoer naar huis.

### De operatie

Vlak voor de operatie tekent de arts het huiddeel af dat weggenomen moet worden. Bij de operatie maken we een snee net boven de wenkbrauw. Het huidoverschot halen we weg. De wond sluiten we met een dunne hechtdraad en kleine pleisters. Het litteken is de eerste maanden goed zichtbaar.

### Na de operatie

Na de operatie moet u alle instructies van uw arts zorgvuldig opvolgen. Dit is belangrijk voor het succes van de behandeling.

- U mag regelmatig koelen volgens de instructies van uw arts. U kunt dit het beste doen met een koelbril of een boterhamzakje gevuld met een eetlepel bevroren diepvrieserwtten. Het koelen helpt tegen de zwelling en de pijn.
- Na de operatie mag u gedurende een week niet tillen, persen of bukken.
- De hechtingen verwijderen we na 7 tot 10 dagen.
- In de eerste weken kan de huid blauw worden tot op de wang. Nadat het blauw verdwenen is, is er nog een zwelling die langzaam verdwijnt.
- Na ongeveer 3 maanden worden de littekens soepeler en kan de wenkbrauw iets zakken.
- Een litteken heeft 12 maanden nodig voordat het helemaal uitgerijpt is en de kleur en dikte heeft die blijft.

### Risico's en complicaties

Aan elke chirurgische operatie zitten risico's. Voordat u beslist of u een directe wenkbrauwlift wilt laten doen, is het belangrijk dat u zich laat informeren over de risico's. Het is tenslotte uw eigen keuze.

#### Asymmetrie

Bij de meeste mensen zijn de ogen van tevoren niet exact symmetrisch. Na de operatie kan altijd asymmetrie ontstaan. Ook zwellingen kunnen voor asymmetrie zorgen.

### **Doof gevoel van het ooglid**

Tijdens de operatie hebben we kleine zenuwtakjes doorgesneden. Rondom het litteken tot en met het voorhoofd kan het daarna gevoelloos zijn. U kunt ongeveer 3 tot 6 maanden een doof gevoel van het ooglid houden.

### **Littekenvorming**

Soms ontstaan er wat kleine cystes in het litteken. Deze geelwitte bobbeltjes op de huid verdwijnen meestal vanzelf. In zeldzame gevallen verwijdert de arts de cyste operatief.

Het litteken kan ook zorgen voor een kleurverschil en een verdikking van de huid. Dat trekt meestal na verloop van tijd weer weg.

### **Droogheid ogen**

De ogen kunnen net na de operatie wat droog aanvoelen omdat de traanproductie iets verstoord kan worden. Dit gaat vanzelf weer over. Heeft u voorafgaand aan de operatie al last van droge ogen? Meld dit dan vooraf aan uw arts. Uw klachten kunnen door de operatie verergeren. U kunt van uw arts oogdruppels of zalf krijgen die het uitdrogen tegengaan.

### **Opengaan wond**

Een wond kan altijd opengaan. Meestal gaat dat spontaan weer dicht. Soms moeten we opnieuw hechten.

### **Infectie**

De kans op een infectie is erg klein.

### **Pijn**

Na de operatie kunt u wat pijn en gevoeligheid ervaren. Paracetamol helpt goed tegen deze pijn. Helpt dit niet? Neem dan contact op met uw arts.

### **Nabloeding**

Er kan een bloeding ontstaan. Een bloeding is meestal snel te stoppen.

### **Chirurgische anesthesie**

Bij zowel plaatselijke als algehele verdoving is er een risico op complicaties, letsel en zelfs overlijden.

### **Allergische reacties**

In zeldzame gevallen treden plaatselijke allergieën op voor tape, hechtmateriaal, lijm, bloedproducten, preparaten of geïnjecteerde middelen. Ook ernstige reacties, waaronder een anafylactische shock, kunnen optreden als reactie op medicijnen die gebruikt worden tijdens de operatie en medicijnen op voorschrift. Bent u bekend met een allergie? Geef dit dan door aan uw arts.

## **Wat te doen bij complicaties**

Krijgt u de eerste 2 weken na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

- De polikliniek plastische chirurgie is te bereiken op telefoonnummer 088 - 70 68 402. Kijk voor hun actuele bereikbaarheid op: [Plastische chirurgie - Bravis | Bravis](#)
- Buiten kantoor tijden kunt u tot 1 week na de operatie bellen met de afdeling spoedeisende hulp:
  - locatie Bergen op Zoom: 088 – 70 67 302
  - locatie Roosendaal: 088 - 70 68 889
- Heeft u vraag geen spoed? Neem dan contact op via de Beter Dichtbij App